

ワクチンの進め方

●1歳未満

- ①3ヶ月:まず3種混合から始めます
(生後2ヶ月からヒブ、肺炎球菌を先行して接種できます)
- ②3種混合 +ヒブ +肺炎球菌 という考え方です。
3種混合を単独で接種後、ヒブ、肺炎球菌を同時あるいは別々(1週間間隔で可)に接種します。3つ同時接種も可です。
- ③次にBCGです(生後6ヶ月までに)
3種混合、ヒブ、肺炎球菌を接種している間に生後6ヶ月になりそうになったら途中でBCGを接種して下さい。
BCG接種後は4週間間隔を空ければ、3種混合、ヒブ、肺炎球菌の接種に戻れます。
- ④3種混合、ヒブ、肺炎球菌、BCGが終了したらポリオです。
瑞穂市の場合保健センターで2回飲みます。
(現在では唯一の経口ワクチン)

●1歳以上

- ①1歳の誕生日を迎えたその日から麻疹風疹混合ワクチンが接種できます(2回目は年長さんでうちます。就学前)
- ②3種混合のⅠ期3回目の1年後に3種混合のⅡ期を接種します。
- ③その後、水痘、おたふくかぜワクチンがあります。
これは日本では任意ですが、うっておくと良いワクチンです。
先進国で定期接種化していないのは日本だけです。
- ④3歳からは日本脳炎ワクチンです。
Ⅰ期は2回あります。1回接種は最短で7日後、最長で4週以内に2回目を接種します。
2回目のおおむね1年後にⅡ期をうちます。
Ⅲ期は9歳になったら接種します。5年後にⅣ期があります。
日本脳炎ワクチンは計4回うつこととなります。

ワクチンの接種間隔について

生ワクチン




- ・麻疹風疹(MR)
- ・水痘(みずぼうそう)
- ・おたふくかぜ
- ・BCG
- ・ポリオ

1. これらを接種したら4週間間隔をあけて次のワクチンが接種できます。

4週後の日にうてます。

2. **生ワクチン** 以外のワクチンを接種した後は1週間間隔をあけて、次のワクチンが接種できます。

7日後の日にうてます。



お知らせ

診療のお休みのお知らせ

9月15日(木)から17日(土)まで休診します。

小児夜間急病センター当番日

9月2日(金) 19:30-22:30(受付)
岐阜市民病院